

# Подготовка пациента и правила сбора кала

Кал для исследования на гельминтозы, протозоозы и копрограмму и доставляется в клинику утром, желательно, чтобы с момента дефекации до исследования прошло не более 12 ч (при условии правильного хранения — на холоде).

Кал для исследования должен быть собран в чистую, сухую, широкогорлую посуду из стекла или пластмассы без примесей мочи, выделений из половых органов и других веществ, в том числе лекарств.

**Кал, доставленный в банках и флаконах с узким горлом, в спичечных коробках, бумаге и т. д. на исследование не принимается!**

Перед исследованием кала отменяется прием медикаментов, влияющих на секреторные процессы, а также усиливающих перистальтику кишечника, и медикаментов, примеси которых в кале изменяют его цвет или мешают при микроскопическом или химическом исследовании (слабительные, ваго- и симпатикотропные средства, сульфат бария, препараты висмута, железа, каолин, ректальные свечи, приготовленные на жировой основе, ферментные препараты, и другие препараты, влияющие на процессы переваривания и всасывания).

Запрещается направлять кал на исследование после клизм. После рентгенологического исследования желудка и кишечника исследование кала допускается проводить не ранее, чем через 2 суток.

Кал для исследования на **Эластазу** должен быть доставлен в лабораторию в тот же день. Для исследования необходимо небольшое количество оформленного кала (с горошину). Жидкий кал для исследования не принимается.